

Bőrfertőtlenítés

ASEPTODERM[®] 2 % CHG

Használatra kész, alkoholos bőrfertőtlenítő szer

- Használatra kész, szintelen bőrfertőtlenítő szer
- Jól alkalmazható műtéti beavatkozások előtti bőrfertőtlenítésre
- 70 %-os alkohol és 2 %-os Klórhexidin-diglükonát bázisú

A készítmény típusa

Használatra kész, alkoholos bőrfertőtlenítő szer, mely permetezéssel vagy lemosással történő bőrfertőtlenítésre alkalmazható. Az ASEPTODERM 2 % CHG[®] felhasználható az injekciók, incíziók, punkciók, vérvétel, katéterezés, kisebb műtéti beavatkozások, baleseti- és bagatell sérülések estén. Szintén alkalmas a pre- és posztoperatív bőrfertőtlenítésre is. A termék kiemelkedően bőrbarát. Aldehyd-, fenol- és QAC-mentes.

Alkalmazási területek

Bőrfertőtlenítéshez (tesztelve EN 12791 szerint).

Antimikrobiális spektrum

- baktericid
- yeasticid

Felhasználás

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni! A fertőtlenítéskor ügyeljünk arra, hogy a bőrfelület a behatási idő végéig nedves maradjon!

Behatási idők:

Injekció, punkció, vérvétel előtt: 1 perc

3 órás bőrfertőtlenítő hatás (műtéti bőrfelület fertőtlenítése): 3 perc

Behatási idők

Antimikrobiális tulajdonságok			1 perc	3 perc
3 órás bőrfertőtlenítő hatás	EN 12791			•
baktericid	EN 13727	tiszta körülmények esetén	•	
yeasticid	EN 13624	tiszta körülmények esetén	•	

Összetétel (INCI)

100g oldat hatóanyagtartalma:

63,1 g 2-Propanol (70% Isopropanol v/v),

2 % Klórhexidin-diglükonát (CHG) w/v.



ASEPTODERM[®] 2 % CHG

Használatra kész, alkoholos bőrfertőtlenítő szer**Szakvélemények****Prof. Dr. H.-P. Werner, közegészségügyi szakértő Schwerin:**

Szakértői jelentés a bőrfertőtlenítésről EN 12791 alapján.

Szakértői jelentés a baktericid és yeasticid hatékonyságról EN 13727/ EN 13624 alapján.

Speciális információ

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Csak ép bőrfelületen alkalmazható. Ne alkalmazzuk nyálkahártyán, és szem környéki bőr fertőtlenítésére. Másztisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni. Orvosi tanácsadás esetén, vigye magával a készítmény címkéjét, csomagolását. Az edény tartsa szorosan lezárva. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi / országos előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét.

Szállítási egységek

Termék	Kiszerezési egység	Úrtartalom	Szállítási egység
ASEPTODERM 2 % CHG	szórófejes flakon	100 ml	30 x 100 ml
	szórófejes flakon	250 ml	20 x 250 ml
	flakon	1 L	12 x 1 L

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH

Malsfeld, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher - Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

EMMI engedély: engedélyköteles

OKBI bejelentés: bejelentés köteles

OGYÉI bejelentés: nem OGYÉI bejelentés köteles

Használja biztonságosan a fertőtlenítőszeret. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.